

Calmafusion - 440

CaMg 380/60/50 otopina za infuziju



*Calmafusion-440 otopina za infuziju,
optimalnog sastava za tretman hipokalcemije*

Calmafusion – 440

Otopina za parenteralnu primjenu

Calmafusion je otopina za infuziju, optimalnog omjera za tretman hipokalcemije u goveda, ovaca i svinja. Hipokalcemija se kod navedenih životinja javlja uz metaboličke promjene.

Glavna prednost kalcij glukonata je izvanredna tolerancija tkiva. Topivost kalcij glukonata je poboljšana dodavanjem boratne kiseline. Dodavanjem magnezija štite se organi od negativnog učinka intravenozne aplikacije kalcija.

SASTAV U ML

Kalcij glukonat	380 mg
Magnezij	60 mg
Boratna kiselina	50 mg

INDIKACIJE

Calmafusion – 440 primjenjuje se za liječenje akutne hipokalcemije kada je dodatno pogoršana nedostatkom magnezija

DOZIRANJE

Za polaganu primjenu u venu, a preporučeno trajanje tretmana je 20 do 30 min
Manje količine (manje od 50 ml) treba davati sterilnom štrcaljkom ili infuzijskom pumpom sa štrcaljkom

Govedo

Primjenjuje se 14–20mg Ca (0,34 – 0,51 mmol Ca) i 2,9 – 4,3 mg Mg (0,12 – 0,18 mmol Mg)/kg t.m. što odgovara 0,4 – 0,6 mL VMP–a/kg t.m.

Ovce, tele, svinja

Primjenjuje se 10 – 14mg Ca (0,26 – 0,34 mmol Ca) i 2,2 – 2,9 mg Mg (0,09 – 0,12 mmol Mg)/kg t.m. što odgovara 0,3 – 0,4 mL VMP–a/kg t.m.

Navedene upute za doziranje služe kao smjernice te se moraju prilagoditi manjku kalcija i stvarnom stanju krvožilnog sustava. Primjena VMP–a može se ponoviti najmanje 12 sati nakon prve primjene. Primjena VMP–a se može ponavljati svaka 24 sata ukoliko se nastave simptomi hipokalcemije

KARENCIJA

Goveda, svinja, ovce:

Meso i jestive iznutrice: nula dana

Goveda, ovce:

Mlijeko: nula sati

PAKIRANJE:

Bočica od 500 ml



sales@interchemie.com | interchemie.com

Manufactured by
Interchemie werken "De Adelaar" B.V.
Metaalweg 8, Venray, The Netherlands

XFMICM-EN-01-25082020