




Interflox-100

Otopina za injekciju za goveda, svinje, ovce i koze

100 ml pakiranje, 100 mg/ml Enrofloksacin



Liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih sojeva bakterija *Pasteurella multocida* i *Mannheimia haemolytica* te *Mycoplasma* spp. osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje teškog akutnog mastitisa uzrokovanog sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje infekcija probavnog sustava uzrokovanih sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje septikemije uzrokovane sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje artritisa uzrokovanog sojevima *Mycoplasma bovis* osjetljivih na enrofloksacin kod goveda mlađih od 2 godine.

Doziranje: 1 ml VMP/20 kg t.m., 1x dnevno, s.c. ili i.v.

Karencija: Nakon primjene u venu: Meso i jestive iznutrice-5 dana, Mlijeko-3 dana

Nakon potkožne primjene: Meso i jestive iznutrice-12 dana, Mlijeko-4 dana

Liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih sojevima bakterija *Pasteurella multocida* i *Actinobacillus pleuropneumoniae* te *Mycoplasma* spp. osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje infekcija mokraćnog sustava uzrokovanih sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje postporođajnog sindroma disgalaktije - PDS (MMA sindrom) uzrokovanog sojevima *Escherichia coli* i *Klebsiella* spp. osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje infekcija probavnog sustava uzrokovanih sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje septikemije uzrokovane sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Doziranje: 0,5 ml VMP/20 kg t.m., 1x dnevno, i.m., MAX: 1ml VMP/20 kg t.m., 1x dnevno, i.m.

Karencija: Meso i jestive iznutrice-13 dana

Liječenje infekcija probavnog sustava uzrokovanih sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje septikemije uzrokovane sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje mastitisa uzrokovanog sojevima bakterija *Staphylococcus aureus* i *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Doziranje: 1 ml VMP/20 kg t.m., 1x dnevno, s.c.

Karencija: Meso i jestive iznutrice-4 dana, Mlijeko-3 dana

Liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih sojeva bakterija *Pasteurella multocida* i *Mannheimia haemolytica* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje infekcija probavnog sustava uzrokovanih sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje septikemije uzrokovane sojevima *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Liječenje mastitisa uzrokovanog sojevima bakterija *Staphylococcus aureus* i *Escherichia coli* osjetljivih na enrofloksacin.

Doziranje: 1 ml VMP/20 kg t.m., 1x dnevno, s.c.

Karencija: Meso i jestive iznutrice-6 dana, Mlijeko-4 dana

PROIZVOĐAČ: Interchemie werken "De Adelaar" BV,
Sales office:
Laan van Diepenvoorde 25, 5582 LA Waalre, The Netherlands

ZASTUPNIK ZA HRVATSKU: Forvet d.o.o., P. Miškine 16c, Bjelovar

